



### İri ve ağır meyve



## ÖZELLİKLER

### Hastalık dayanımı

IR : Downy mildew (BI) : 16, 18-20, 23-26, 28,31  
;

### Derim süresi

50-55 gün

### Dönem

Güzlük ve baharlık

### Avantajlar

Çiğ köftelik ideal yapıda yaprak

## AÇIKLAMALAR

### Bitki

İri baş yapısı

Yaprak sarması çok iyi

Meyve ağırlığı 1,3-1,8kg

Soğuk şartlara dayanıklı yapı

## TAVSİYE ETTİKLERİMİZ

Sera ve açık tarlada iri baş yaprak sarma dokusu ile özellikle çiğ köftelik yetiştiriciliğe uygundur.

**Vilmorin, Vilmorin-Mikado İş Birimi'ne ait bir markadır.** Genetik hastalık dayanımlarının olması ayrıca profilaktik (coğrafi bölge, meteorolojik şartlar, toprak yapısı, hastalıklar, ekim/dikim usulleri, ile bunlarla sınırlı olmaksızın ekim/dikim ve yetiştirmeden kaynaklanan diğer tüm önleyici ve koruyucu tedbirler) tedbirlerin alınması gerektiği anlamına gelmez. Burada belirtilen tüm öneriler, tavsiyeler, büyüme ve olgunlaşma döngüleri sadece yol gösterici niteliktedir, kendi gözlemlerimize ve genel deneyimimize dayanır. Bu bilgiler bir sözleşme taahhütü içermez ve mutlaka başarılı bir hasat veya ürün alacağınız anlamına gelmez. Yetiştirilecek olan ürünün başarısı tohumla ilgisi olmayan faktörlere de bağlıdır.