



Mükemmel kalite ve renk



ÖZELLİKLER

Hastalık dayanımı

HR : Alternaria (Ad) ; Külleme (Eh) ;
IR : Aster Yellows (Ay) ; Pythium (P) ;

Yetiştirme dönemi

Ana sezon ve depolama

Derim süresi

130-140 gün

Avantajlar

Geç dönemde yüksek verim ve kalite

AÇIKLAMALAR

Yaprak

Sapa kalklamaya tolerans

Orta hacimli dik yaprak yapısı

Geç sezonda dahi makinalı hasada uygunluk

Kök

Hafif konik kök yapısı, 19-21 cm

Çok pürüzsüz mükemmel cilt yapısı ve
yeknesaklık

Yeşil omuzluluğa ve iç kısımda yeşillenmeye
dayanıklı

Mekanik zararlanmaya dayanıklı

Çukur çürüklüğe (Cavity spot) tolerans

Erkencilik

Orta geççi, 130-140 gün

Vilmorin, Vilmorin-Mikado İş Birimi'ne ait bir markadır. Genetik hastalık dayanımlarının olması ayrıca profilaktik (coğrafi bölge, meteorolojik şartlar, toprak yapısı, hastalıklar, ekim/dikim usulleri, ile bunlarla sınırlı olmaksızın ekim/dikim ve yetiştirmeden kaynaklanan diğer tüm önleyici ve koruyucu tedbirler) tedbirlerin alınması gerektiği anlamına gelmez. Burada belirtilen tüm öneriler, tavsiyeler, büyüme ve olgunlaşma döngüleri sadece yol gösterici niteliktedir, kendi gözlemlerimize ve genel deneyimimize dayanır. Bu bilgiler bir sözleşme taahhütü içermez ve mutlaka başarılı bir hasat veya ürün alacağınız anlamına gelmez. Yetiştirilecek olan ürünün başarısı tohumla ilgili olmayan faktörlere de bağlıdır.

